

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
BULLETIN TECHNIQUE DE LA  
STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES  
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

AVEYRON. AUDE. GARD. HÉRAULT. LOZÈRE. PYRÉNÉES-ORIENTALES

MONTPELLIER - 16, Rue de la République - Tél. 72 58-72 - C. C. P. 52 38 57

6ème année n° 40

Edition générale n° 8

9 octobre 1958

INFORMATIONS

LE TRAITEMENT DES ARBRES FRUITIERS A L'AUTOMNE

L'application d'un traitement antiparasitaire est nécessaire sur les abricotiers, les cerisiers, les pêchers, à l'automne, afin de combattre divers parasites.

**MONILIA** - Cette maladie est parfois très répandue sur les abricotiers; elle occasionne également des dégâts aux cerisiers et aux pruniers.

Pour réduire les contaminations, couper et brûler les rameaux tués par la maladie et les fruits momifiés. Dans les vergers ayant subi d'importants dégâts du fait du Monilia, l'émondage à l'automne est indispensable pour assurer la réussite des traitements printaniers ultérieurs.

**MALADIE DES FEUILLES CRIBLEES** - La criblure du feuillage est provoquée par deux champignons : le Coryneum et le Fusicocum, qui attaquent également les rameaux où se créent des chancres. Les périodes humides de l'automne, sont très favorables à la maladie qui pénètre dans les tissus par les blessures naturelles ou artificielles (chutes de feuilles, plaies de taille, etc...)

Les traitements cupriques ont été longtemps utilisés, leur efficacité est réelle mais ils provoquent des brûlures sur des tissus mal aoûtés. C'est pourquoi on utilisera avec moins de risques, le sulfate d'oxyquinoléine, le captane, le zirame, le ferbame, le zinèbe, les soufres micronisés, le soufre dispersé, le T.M.T.D.

Traiter dès le début de la défoliation, renouveler le traitement si des pluies abondantes se produisent avant la fin de la chute des feuilles.

Ce traitement doit être effectué dès maintenant sur les vergers ayant été largement arrosés.

**CHENILLES ARPENTEUSES** - Cerisiers et abricotiers ont au printemps subi les attaques de chenilles arpen-teuses qui dévoraient les feuilles, les fleurs, les jeunes fruits. Ce sont les larves de papillons éclos à l'automne dont les femelles sont aptères (dépourvues d'ailes). Cette particularité permet une lutte efficace et économique. A l'automne les femelles aptères montent le long du tronc afin de déposer leurs oeufs à l'extrémité des rameaux. La pose d'une ceinture de glue empêche l'ascension des femelles prévenant la naissance de larves au printemps.

Il faut choisir une glue peu sécatrice que l'on étendra sur des bandes de papier ou à la rigueur directement sur le tronc en se conformant aux indications du fabricant.

LUTTE CONTRE LES RONGEURS ET LES OISEAUX NUISIBLES

La lutte contre ces parasites doit être collective pour être efficace. Les Groupements de défense étant chargés de réaliser les luttes collectives, l'Inspection de la Protection des Végétaux donnera tous renseignements utiles.

Le Contrôleur chargé des  
Avertissements Agricoles,

L.L.TROUILLON

DLP 10-10-58 315461

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux,  
P.BERVILLE